Caracterização clínica e motora-funcional de idosos hospitalizados pós-Acidente Vascular Cerebral

Clinical and motor functional of hospitalized elderly after Stroke

Maria Clarice Lopes da Silva¹, Janaíne Cunha Polese², Juliana Maria Pimenta Starling³, Leani Souza Máximo Pereira⁴

RESUMO

Objetivo. Caracterizar uma amostra de idosos pós Acidente Vascular Cerebral (AVC) agudo internados em uma unidade de AVC de um hospital universitário quanto a variáveis clínicas e motora-funcionais, bem como verificar possíveis ganhos motores durante o período de internação. **Método.** Estudo observacional retrospectivo com coleta de dados a partir de fichas de avaliação padronizadas do setor de fisioterapia. Foram coletados o sexo e idade dos pacientes, além de variáveis clínicas e motora-funcionais. Estatísticas descritivas para caracterização da amostra foram realizadas. **Resultados.** De um total de 349 idosos que passaram pela unidade entre maio de 2012 a agosto de 2013, 52% eram homens, a média de idade foi de $73 \pm 8,1$ anos, sendo que 85% sofreram AVC isquêmico. Os pacientes receberam uma média de $8 \pm 9,6$ sessões de fisioterapia e foi observado aumento percentual nas variáveis motora-funcionais: controle de tronco sem apoio, equilíbrio estático bom e deambulação sem apoio no momento da avaliação fisioterápica final em comparação à avaliação inicial (aumentos em 13%, 12% e 13%, respectivamente). **Conclusões.** A identificação clínica e motora-funcional de indivíduos idosos em uma unidade de AVC pode possibilitar o planejamento e implantação de estratégias de reabilitação eficazes tanto na internação quanto após a alta hospitalar.

Unitermos. Acidente Vascular Cerebral, Fisioterapia, Idosos, Hospitalização

Citação. Silva MCL, Polese JC, Starling JMP, Pereira LSM. Caracterização clínica e motora-funcional de idosos hospitalizados pós-Acidente Vascular Cerebral.

Trabalho realizado no Hospital Risoleta Tolentino Neves da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte-MG, Brasil.

1. Fisioterapeuta, Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte-MG, Brasil.

2. Fisioterapeuta, Doutoranda em Ciências da Reabilitação, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Belo Horizonte-MG, Brasil. Ph.D Candidate in Health Sciences, University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia.

3. Fisioterapeuta, Mestranda em Ciências da Reabilitação, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Belo Horizonte-MG, Brasil.

4. Fisioterapeuta, Doutora, Professora Adjunta do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte-MG, Brasil.

ABSTRACT

Aim. To characterize a sample of elderly after acute stroke admitted to a stroke unit of a university hospital regarding clinical, functional, and motor variables and check possible motor gains during the period of hospitalization. **Method.** An exploratory cross-sectional study was conducted with data collection from the physical therapy unit assessment standardized files. Sex and age were collected, in addition to clinical and functional and motor variables. In order to characterize the sample, descriptive statistics were performed. **Results.** A total of 349 elderly post stroke that went through the unit from May 2012 to August 2013, 52 % were men, with an average age of 73 ± 8.1 years, and 85 % suffered ischemic stroke. The average number of physiotherapy sessions received by patients was 8 sessions. There were gains in the percentage values of the variables: trunk control without support, good static balance and ambulation without support for the final physical therapy evaluation compared to baseline (increases by 13%, 12 % and 13 %, respectively). **Conclusions.** The clinical and motor -functional identification of elderly individuals in a stroke unit can enable the planning and implementation of effective rehabilitation strategies at admission and after discharge.

Keywords. Stroke, Physical Therapy, Aged, Hospitalization

Citation. Silva MCL, Polese JC, Starling JMP, Pereira LSM. Clinical and motor functional of hospitalized elderly after Stroke

Endereço para correspondência:

Leani Souza Máximo Pereira

Departamento de Fisioterapia – UFMG

Av. Antônio Carlos, 6627, Campus Pampulha

CEP 31270-901 Belo Horizonte-MG, Brasil

Fone: 55-31-3409-73-95 Fax: 55-31-3409-4781

E-mail: leanismp.bh@terra.com.br; mcla.lopes@yahoo.com.br

Original

Recebido em: 02/04/14

Aceito em: 08/08/14

Conflito de interesses: não

INTRODUÇÃO

O crescente envelhecimento populacional pelo qual vem passando os países em desenvolvimento, no qual se inclui o Brasil, coloca em evidência uma notória incidência de doenças que atingem principalmente a população idosa, dentre elas, as doenças cerebrovasculares, destacando-se o Acidente Vascular Cerebral (AVC) como a sendo mais frequente¹. Sabe-se que há um aumento da sua incidência a partir da sexta década de vida, praticamente dobrando a relação a cada nova década².

O AVC pode causar deficiências graves que afetam a estrutura corporal, podendo impactar na funcionalidade do indivíduo^{3,4}. No idoso em especial, a presença de incapacidades apresentadas pós-AVC agudo, associadas ou não a alterações fisiológicas decorrentes do próprio processo de envelhecimento podem influenciar negativamente na reabilitação⁵. A habilidade de alinhar o tronco e manter-se sentado e a capacidade de permanecer em ortostatismo com um bom equilíbrio e deambular, por exemplo, podem tornar-se aquisições mais difíceis pós-AVC, principalmente ao indivíduo idoso^{5,6}. Diversos estudos vêm colocando em evidência fatores que são preditivos de piores resultados funcionais pós-AVC, dentre eles: a diminuição acentuada ou ausência de movimentação e uso do membro superior e/ou inferior acometido, a perda de equilíbrio e coordenação na posição sentado e em ortostatismo, além da idade avançada⁷⁻¹¹.

A avaliação e identificação dos déficits e incapacidades na fase aguda do AVC devem começar desde a fase de internação hospitalar¹². Nesse contexto, ressaltar-se a importância das Unidades de AVC hospitalares, que contam com uma equipe multidisciplinar especialmente capacitada no atendimento dessa condição de saúde¹³. A avaliação clínica e motora-funcional dos indivíduos, especialmente idosos, ainda na fase hospitalar possibilita o planejamento e implantação de estratégias de reabilitação eficazes e direcionadas, além de promover a otimização dos serviços oferecidos^{13,14}. Quanto mais precocemente condições clínicas e motora-funcionais passíveis de intervenção puderem ser identificados, melhor poderá ser o prognóstico terapêutico e a probabilidade de recuperação do indivíduo^{10,15}. Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi caracterizar uma amostra de idosos pós AVC agudo internados em uma Unidade de AVC de um hos-

pital universitário quanto a variáveis demográficas, clínicas e motora-funcionais, bem como verificar possíveis ganhos motores durante o período de internação.

MÉTODO

Amostra

Foi realizado um estudo observacional retrospectivo com coleta de dados realizado a partir de fichas de avaliação padronizadas criadas pelo setor de fisioterapia da Unidade de AVC do Hospital Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte.

A amostra foi composta por pacientes idosos internados na unidade de AVC do próprio hospital no período de maio de 2012 a agosto de 2013, de acordo com os seguintes critérios de inclusão: (1) acometimento por AVC ou Ataque Isquêmico Transitório (AIT) diagnosticado pelo médico, (2) indivíduos que tivessem idade igual ou superior a 60 anos. Foram excluídos do estudo indivíduos internados por diagnóstico de outras condições de saúde que não o AVC, além de pacientes que não puderam ser avaliados durante todo o período de internação devido instabilidade clínica limitante ou quadro confusional agudo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, parecer nº 414.149.

Procedimento

Para caracterização da amostra foram coletados a idade, sexo, além de variáveis clínicas e motora-funcionais contidos na ficha de avaliação padronizada criada pelo serviço de fisioterapia da unidade de AVC do Hospital Risoleta Tolentino Neves e que eram preenchidas pelos próprios fisioterapeutas, os quais passavam por um treinamento prévio antes de começarem a atuar no setor.

Variáveis Clínicas

Foram analisados: (1) tipo de AVC (isquêmico, hemorrágico ou AIT), (2) realização ou não de trombólise, (3) lado do hemisfério acometido (sem acometimento, direito, esquerdo ou ambos), (4) a necessidade de ventilação mecânica com tubo orotraqueal, ventilação não invasiva e/ou aspiração nasotraqueal e (5) o desfecho final do paciente (se alta hospitalar, alta fisioterapêutica, transferência de enfermagem, transferência de instituição, Cen-

tro de Terapia Intensiva (CTI) ou óbito). Foi registrado ainda o tempo entre a data do ictus e a data da admissão hospitalar, o número de dias em acompanhamento com a fisioterapia e a quantidade de atendimentos fisioterápicos (sessões) recebidos pelos pacientes da amostra.

Variáveis Motora-Funcionais

As variáveis motora-funcionais dos indivíduos participantes foram avaliados e classificados da seguinte forma:

- Acometimento do membro superior e do membro inferior: se (1) plégico, (2) parético, (3) dismétrico ou (4) sem déficit motor.

- Controle de Tronco: avaliado como a capacidade do indivíduo em manter-se assentado a beira do leito por no mínimo 60 segundos. Capacidade de manter-se sentado pelo tempo estabelecido sem nenhum suporte no tronco era dado como controle de tronco sem apoio (1) e necessidade de algum tipo de suporte externo no tronco era dado como com apoio (2). Controle de tronco não avaliado/realizado (3) era classificado pela impossibilidade de se ficar assentado pelo tempo estabelecido ou devido alguma instabilidade clínica que impedisse a realização do teste.

- Equilíbrio estático: (1) equilíbrio bom era dado pela capacidade do indivíduo manter-se em ortostatismo por um minuto sem apoio e em posição tandem por 10 segundos. (2) equilíbrio regular como a capacidade do indivíduo manter-se em ortostatismo por um minuto sem apoio, porém incapaz de ficar em posição tandem por 10 segundos. (3) equilíbrio ruim foi classificado quando o indivíduo não conseguia manter-se em ortostatismo por um minuto e/ou necessariamente necessitava de auxílio externo (segurar em uma pessoa ou em um dispositivo de auxílio). Impossibilidade de realização do teste foi considerado como (4) não avaliado/realizado.

- Deambulação: avaliado com o indivíduo percorrendo uma distância de 10 metros em um corredor com velocidade usual e classificada: (1) sem apoio - quando o indivíduo foi capaz de caminhar sem qualquer auxílio externo, com bom equilíbrio, (2) apoio único - necessidade de deambular com apoio unilateral, como o uso de uma bengala, muleta ou auxílio unilateral de uma pessoa, (3) apoio duplo - quando o paciente necessitava de

apoio externo bilateral para deambular, e, por fim, (4) não avaliado/realizado quando não era possível se fazer a avaliação da marcha.

Todas as variáveis motoras eram avaliadas e registradas no momento da Avaliação I (avaliação fisioterápica inicial realizada no dia da admissão do paciente na unidade de AVC) e na Avaliação II (avaliação fisioterápica final correspondente ao dia do desfecho final do paciente), e foram utilizadas no presente estudo para comparação dos resultados entre os dois momentos.

Análise Estatística

Foram utilizadas estatísticas descritivas para caracterização da amostra. Os dados são apresentados como medidas de tendência central (média e desvio padrão) para as variáveis quantitativas, e medidas de frequência e porcentagem para as variáveis categóricas. Todas as análises foram realizadas utilizando o programa estatístico SPSS para Windows versão 17.0.

RESULTADOS

Durante o período de um ano e três meses foram internados na Unidade de AVC do HRTN 349 idosos, com uma média de idade de $73 \pm 8,1$ anos. Do total da amostra, 52% dos indivíduos eram do sexo masculino ($n=183$) e 48% do sexo feminino ($n=166$).

Variáveis Clínicas

Em relação ao tipo de AVC, 85% ($n=295$) tiveram o evento isquêmico e apenas 7% o hemorrágico ($n=25$). O AIT foi constatado em 29 pacientes correspondendo a 8% da amostra. Quanto ao tempo de tratamento fisioterápico, foi observada uma média de $7 \pm 7,5$ dias e o número médio de atendimentos de fisioterapia correspondeu a $8 \pm 9,6$ sessões. A grande maioria dos pacientes - 93% não precisaram passar por nenhum procedimento como ventilação mecânica, VNI ou aspiração nasotraqueal. O número de óbitos na unidade foi de apenas 2% sendo que 4% dos pacientes tiveram de ser transferidos para o CTI devido complicações clínicas. A síntese dos dados clínicos é apresentada na Tabela 1.

Variáveis Motora-Funcionais

Com relação às variáveis motora-funcionais ana-

Tabela 1. Caracterização demográfica e clínica da amostra (n=349).

Variáveis Clínicas	Valores Mínimo	Valores Máximo	Média±DP
Idade	60	96	73±8,1
Intervalo Ictus-admissão	0	18	1±2,2
Número de dias (acompanhamento fisioterapia)	1	43	7±7,5
Número de atendimentos (fisioterapia)	1	62	8±9,6

Variáveis Clínicas	Frequência	%
SEXO		
Feminino	166	48
Masculino	183	52
TIPO DE AVC		
Isquêmico	295	85
Hemorragico	25	7
Ataque Isquêmico Transitório	29	8
LADO ACOMETIDO		
Nenhum	20	6
Direito	168	48
Esquerdo	149	43
Direito e Esquerdo	12	3
TROMBÓLISE		
Não	333	95
Sim	16	5
PROCEDIMENTOS		
Nenhum	325	93
Ventilação Mecânica	9	2,6
Ventilação não-invasiva	1	0,4
Aspiração Nasotraqueal	14	4
DESFECHO		
Alta Hospitalar	168	48
Alta Fisioterapêutica	141	41
CTI	15	4
Transferência de Instituição	5	2
Transferência de enfermagem	12	3
Óbito	8	2

CTI: Centro de Terapia Intensiva, DP=desvio padrão, %=porcentagem

o membro superior classificado como sem déficit motor na avaliação fisioterápica inicial, sendo que esse valor aumentou para 39% após a avaliação fisioterápica final. Concomitantemente os que tiveram o membro inferior classificado como sem déficit motor passou de 37% para 43%, entre a avaliação inicial e final. Os pacientes idosos que possuíam controle de tronco sem apoio no momento da avaliação I eram de 70%, passando para 83% na avaliação II, havendo um ganho percentual em 13% para essa variável. Houve ganhos também nos valores encontrados para a variável equilíbrio estático, com um aumento percentual em 12% dos que tiveram essa condição motora classificada como boa entre a avaliação I e II. Já a quantidade de idosos que deambularam sem apoio passou de 34% na avaliação inicial para 47% na avaliação final, com um ganho percentual em 13%. Os dados correspondentes às variáveis motora-funcionais podem ser observados na Tabela 2.

DISCUSSÃO

Este estudo caracterizou uma amostra de indivíduos idosos internados em uma unidade de AVC de um hospital universitário. A proporção de idosos acometidos pelo AVC foi relativamente proporcional em ambos os sexos, sendo 48% mulheres e 52% homens. O tipo isquêmico foi o mais prevalente. Foram observados aumento em valores percentuais na maioria das variáveis motora-funcionais analisadas entre o momento da avaliação fisioterápica inicial para a avaliação final.

De acordo com dados da literatura, a frequência de AVC é maior em homens do que nas mulheres até os 55 anos e, após essa idade, o risco de ocorrência do evento cerebrovascular aumenta e sua frequência é praticamente igual em ambos os sexos¹⁶. Além disso, o AVC isquêmico é responsável por grande parte dos acometimentos, com uma média de prevalência de 80 a 85% do total de casos^{1,14,16}. Os achados do presente estudo corroboram os dados da literatura, sendo que a média de idade dos pacientes internados foi de 73 anos e a proporção de idosos acometidos foi praticamente simétrica em ambos os sexos, com uma ligeira prevalência no sexo masculino. Com relação ao tipo de AVC 85% da amostra tiveram o

Tabela 2. Caracterização motora-funcional da amostra (n= 349).

Variáveis Motoras	Primeira Avaliação		Segunda Avaliação	
	Frequência	Porcentagem	Frequência	Porcentagem
MEMBRO SUPERIOR				
Plégico	79	23	65	19
Parético	148	42	143	41
Dismétrico	5	1	5	1
Sem déficit motor	117	34	136	39
MEMBRO INFERIOR				
Plégico	51	15	41	12
Parético	164	47	153	44
Dismétrico	4	1	4	1
Sem déficit motor	130	37	151	43
CONTROLE DE TRONCO				
Não avaliado/realizado	64	18	21	6
Com apoio	40	12	38	11
Sem apoio	245	70	290	83
EQUILÍBRIO ESTÁTICO				
Não avaliado/realizado	132	38	69	20
Ruim	18	5	18	5
Regular	53	15	74	21
Bom	146	42	188	54
DEAMBULAÇÃO				
Não avaliado/realizado	165	47	106	30
Apoio duplo	19	5	26	7
Apoio Único	47	14	55	16
Sem apoio	118	34	162	47

evento isquêmico. Em um estudo de caracterização de internações hospitalares por AVC realizado no Sul do Brasil, observou-se também uma ligeira prevalência do AVC em homens, sendo 53,6% da amostra, e o AVC isquêmico sendo responsável por 83,1% dos casos¹⁷. A faixa etária da maioria dos pacientes da pesquisa estava entre 70 a 79 anos de idade. Já em um estudo epidemiológico sobre o AVC em 19 hospitais de Fortaleza, na região Nordeste do Brasil, encontrou uma prevalência do AVC ligeiramente maior na população feminina, com 51,8% da amostra estudada, sendo o tipo isquêmico o mais prevalente com 72,9% do total de acometimentos e uma média de idade dos pacientes de 67,7 anos¹⁸.

médio entre o ictus até a admissão hospitalar foi de um dia. Já em um estudo prévio em hospitais de Fortaleza observou-se um intervalo de 12,9 horas entre o início dos sintomas e a hospitalização dos pacientes da amostra¹⁸. Sabe-se que o tempo entre o início dos sintomas e o adequado atendimento especializado deve ser o mais precoce possível para evitar complicações e otimizar o tratamento específico do AVC¹⁹.

Os dados encontrados sugerem que talvez ainda seja preciso conscientizar mais a população da importância de se procurar o quanto antes um serviço hospitalar adequado diante do início e identificação de alterações clínicas sintomatológicas causadas pelo AVC.

Verificou-se também nesse estudo que o tempo

Foram observados no presente estudo que a porcentagem de indivíduos que estavam sem déficit no membro superior aumentou em 5% do momento da avaliação inicial para a avaliação final e em 6% para o membro inferior. Houve ainda aumento nos valores percentuais em três variáveis motora-funcionais analisadas e suas subclassificações: controle de tronco sem apoio, equilíbrio estático bom e deambulação sem apoio (aumento de 13%, 12% e 13% na avaliação fisioterápica final em comparação à inicial, respectivamente). Esses resultados podem reforçar a importância da reabilitação o mais precoce possível para os indivíduos idosos pós-AVC agudo, com o objetivo de se ganhar mobilidade e independência, principalmente através do treino de tarefas específicas que demandem equilíbrio, associadas com exercícios de fortalecimento^{16,20-22}. Sabe-se que no AVC, as reações de equilíbrio podem estar comprometidas, e com isso, alterações na estabilidade podem ser observadas nas posições sentada e em pé, podendo interferir na funcionalidade do indivíduo^{6,8,21}. No paciente idoso, em especial, esse comprometimento já pode estar presente mesmo antes do dano cerebrovascular, o que exige cuidados redobrados^{15,16}.

A média do número de dias em acompanhamento com a fisioterapia e o número de atendimentos de fisioterapia recebidos pelos pacientes foram de 7 dias e 8 sessões, respectivamente. Esses achados representam um tempo médio de reabilitação mínimo e talvez ainda não ideal para melhora das condições clínicas, considerando-se que nos seis primeiros meses pós-lesão os indivíduos possuem potencial capacidade em reduzir seus déficits^{19,20} e com isso o tratamento fisioterápico deve ser intensivo, principalmente na fase inicial pós-acometimento. Portanto, faz-se necessário, e, seria ideal, a implementação de serviços que acompanhem o indivíduo em um processo reabilitativo mais extenso, oferecendo todo suporte e tratamento ao paciente logo após a alta hospitalar para continuidade dos cuidados.

O AVC é responsável por grande parte das internações e mortalidade dos idosos¹², podendo causar na grande maioria dos indivíduos comorbidades ou algum tipo de deficiência, seja parcial ou completa, o que pode

impactar no quadro clínico e estado de saúde^{4,23}. Nesse estudo, os resultados mostraram que durante a internação hospitalar na unidade de AVC a grande maioria dos pacientes - 93% não precisaram passar por procedimentos como ventilação mecânica, VNI ou aspiração nasotraqueal. O número de óbitos na unidade foi de apenas 2% e 4% dos pacientes tiveram de ser transferidos para o CTI devido complicações clínicas. Esses resultados podem refletir a efetividade do tratamento fisioterápico em evitar complicações respiratórias, além dos cuidados intensivos de toda a equipe de profissionais do setor para com os idosos internados.

Portanto, a partir dos achados, infere-se que a presença de uma unidade de AVC hospitalar, que conte com uma equipe multiprofissional e um serviço de reabilitação eficaz, possa evitar complicações advindas da lesão cerebrovascular e otimizar o tratamento oferecido aos paciente idosos, que são geralmente a maioria dos indivíduos acometidos por AVC.

Os resultados desse estudo podem contribuir para o planejamento e intervenção adequada de medidas reabilitadoras à pacientes idosos pós-AVC agudo e otimização dos serviços de unidades de AVC. Ressalta-se que as fichas de avaliação utilizadas para análise das variáveis desta pesquisa foram as que constavam no serviço de fisioterapia da unidade de AVC do Hospital Risoleta Tolentino Neves e, ademais, salienta-se que as fichas analisadas parecem carecer da inclusão de testes padronizados pela literatura para classificação das variáveis motora-funcionais. Evidenciamos também que os possíveis ganhos motores-funcionais discutidos, devido às particularidades dos dados, não puderam passar por uma análise estatística no qual indicasse a real significância dos achados encontrados. Frisamos ainda que cada setor de reabilitação de centros de internação específicos para cuidados com o paciente na fase aguda do AVC pode possuir um protocolo de avaliação diferente do que foi utilizado nesse estudo.

É necessário mais estudos que caracterizem pacientes em unidades de AVC e que mostrem a importância de se investigar os reais ganhos motores advindos da reabilitação em tal população, além da investigação dos possíveis fatores que interferem no tempo médio entre o ictus e a internação hospitalar.

CONCLUSÃO

Evidenciou-se nesse estudo uma média de idade dos idosos internados de 73 anos, sendo que a distribuição do acometimento em ambos os sexos foi relativamente proporcional, com ligeira prevalência em homens. O AVC isquêmico foi o tipo mais frequente com 85% dos casos. Os idosos da amostra foram acompanhados pela equipe de reabilitação da unidade de AVC e receberam um número médio de sessões de fisioterapia de 8 atendimentos. Observou-se que 34% dos indivíduos tiveram o membro superior classificado como sem déficit motor na avaliação fisioterápica inicial, sendo que esse valor aumentou para 39% após a avaliação fisioterápica final. Concomitantemente os que tiveram o membro inferior classificado como sem déficit motor passou de 37% para 43%, respectivamente. Foram observados ainda ganhos nas variáveis motora-funcionais nas classificações CT sem apoio, equilíbrio estático bom e deambulação sem apoio no momento da avaliação fisioterápica final. Além disso, apenas 2% do total de idosos internados na unidade vieram a óbito e 4% tiveram de ser transferidos para o CTI. Os resultados desse estudo podem contribuir para o planejamento e intervenção adequada de medidas reabilitadoras à pacientes idosos pós-AVC e otimização dos serviços e metas terapêuticas a serem almejadas em unidades de AVC, além de reforçar a importância dos cuidados clínicos intensivos durante a fase aguda da doença.

REFERÊNCIAS

- Freitas EV, Ligia PY. Tratado de geriatria e gerontologia. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011;1750p.
- Ingall T. Stroke – incidence, mortality, morbidity and risk. *J Insur Med* 2004;36:143-52.
- Broeks JG, Lankhorst GJ, Runping K, Prevo AJ. The long-term outcome of arm function after stroke: results of a follow-up study. *Disabil Rehabil* 1999;21:357-64.
- Hopman WM, Verner J. Quality of life during and after inpatient stroke rehabilitation. *Stroke* 2003;34:801-5. <http://dx.doi.org/10.1161/01.STR.0000057978.15397.6F>
- Kon K, Chua KSG, Tow AP. Clinical characteristics and functional outcome of stroke patients 75 years old and older. *Phys Med Rehabil* 1998;79:1535-9.
- Sandin KJ, Smith BS. The measure of balance in sitting in stroke rehabilitation prognosis. *Stroke* 1990;21:82-6. [http://dx.doi.org/10.1016/S0003-9993\(98\)90415-4](http://dx.doi.org/10.1016/S0003-9993(98)90415-4)
- Kwakkel G, Wagenaar RC, Kollen BJ, Lankhorst GJ. Predicting disability in stroke: A critical review of the literature. *Age Ageing* 1996;25:479-89. <http://dx.doi.org/10.1093/ageing/25.6.479>
- Loewen SC, Anderson BA. Predictors of stroke outcome using objective measurement scales. *Stroke* 1990;21:78-81. <http://dx.doi.org/10.1161/01.STR.21.1.78>
- Duarte E, Marco E, Muniesa JM, Belmont R, Diaz P, Tejero M, et al. Trunk control test as a functional predictor in stroke patients. *J Rehabil Med* 2003;34:267-72.
- Denti L, Agosti M, Franceschini M. Outcome predictors of rehabilitation for first stroke in the elderly. *Eur J Phys Rehabil Med* 2008;44:3-11.
- Bagg S, Pombo AP, Hopman W. Effect of age on functional outcomes after stroke rehabilitation. *Stroke* 2002;33:179-85. <http://dx.doi.org/10.1161/hs0102.101224>
- Arboix A, García-Eroles L, Massons J, Oliveres M, Targa C. Acute stroke in very old people: clinical features and predictors of in-hospital mortality. *J Am Geriatr Soc* 2000;48:36-41. <http://dx.doi.org/10.1161/01.STR.0000077924.71088.02>
- Portaria MS/GM nº 665, de 12 de abril de 2012 (endereço na internet). Brasil: Ministério da Saúde (atualizado em: 04/2012; acessado em: 12/2013). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/PRT0665_12_04_2012.html
- Thommessen B, Bautz-Holter E, Laake K. Predictors of outcome of rehabilitation of elderly stroke patients in a geriatric ward. *Clin Rehabil* 1999;13:123-8. <http://dx.doi.org/10.1191/026921599666507386>
- Ergeletz D, Kevorkian CG, Rintala D. Rehabilitation of the older stroke patient: functional outcome and comparison with younger patients. *Am J Phys Med Rehabil* 2002;81:881-9.
- Shah MV. Rehabilitation of the Older Adult with Stroke. *Clin Geriatr Med* 2006;22:469-89. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cger.2005.12.012>
- Schuster RC, Polese JC, Silva SLA, Perin V, Seben YP. Caracterização de internações hospitalares por acidente vascular encefálico na cidade de Passo Fundo – RS. *Con Scientiae Saúde* 2009;8:581-5.
- Carvalho JJ, Alves MB, Viana GA, Machado CB, dos Santos BF, Kanamura AH, et al. Stroke epidemiology, patterns of management, and outcomes in Fortaleza, Brazil: a hospital-based multicenter prospective study. *Stroke* 2011;42:3341-6. <http://dx.doi.org/10.1161/STROKEAHA.111.626523>
- European Stroke Organization (ESO). Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischaemic Attack. *Cerebrovasc Dis* 2008;25:457-507. <http://dx.doi.org/10.1159/000131083>
- Shepherd R, Carr J. Reabilitação Neurológica: otimizando o desempenho motor. Barueri: Manole, 2008, 384p.
- Ashburn A. Physical Recovery Following Stroke. *Physiotherapy* 1997;83:480-90. [http://dx.doi.org/10.1016/S0031-9406\(05\)65636-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0031-9406(05)65636-2)
- Gray CS, French JM, Bates D, Cartledge NEF, James OFW, Venables G. Motor Recovery Following Acute Stroke. Age and Ageing 1990;19:179-84. <http://dx.doi.org/10.1093/ageing/19.3.179>
- Kwon S, Hartzema AG, Duncan PW, Min-Lai S. Disability measures in stroke: relationship among the Barthel Index, the Functional Independence Measure, and the Modified Rankin Scale. *Stroke* 2004;35:918-23. <http://dx.doi.org/10.1161/01.STR.0000119385.56094.32>